MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE GEOLOGIA, MINERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO MINERAL
CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL

PROJETO DE DISPONIBILIDADE HÍDRICA DO BRASIL
CARTA HIDROGEOLÓGICA - ESCALA 1:1.000.000

CARTA HIDROGEOLÓGICA
FOLHA SA.21 SANTARÉM
ESCALA 1:1.000.000 - CPRM, 2016

FOLHA SA.21 SANTARÉM

NOTA TÉCNICA

APRESENTAÇÃO DO PROJETO

O **"PROJETO DE DISPONIBILIDADE HÍDRICA DO BRASIL"** tem por objetivo desenvolver um sistema de informações geográficas na temática de recursos hídricos, a partir do conhecimento geológico e hidrológico existentes, com conformidade com a Missão Institucional da CPRM/SGB, de ***"gerar e difundir o conhecimento geológico e hidrológico básico para o desenvolvimento sustentável do Brasil"***.

Dentre os produtos gerados, destaca-se a Carta Hidrogeológica, um projeto de cartografia hidrogeológica sistemática, concebido para uniformizar e padronizar todos os produtos lançados pela instituição, que se iniciou com o Mapa de Domínios e Subdomínios Hidrogeológicos do Brasil, em 2006, escolhido posteriormente pelo Mapa Hidrogeológico do Brasil, em 2014.

No fase atual, a partir deste Mapa Hidrogeológico, está sendo elaborado o Atlas Hidrogeológico do Brasil, em escala 1:1.000.000, totalmente estruturado, dentro de um Sistema de Informações Geográficas (SIG), composto pelo conjunto das 46 folhas que completam a Carta Internacional do Mundo ao Milionésimo – CIM, cobrindo todo o Brasil.

METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO DAS FOLHAS

Visando a padronização e uniformização de todas as folhas, conforme meta perseguida pelo SGB adotam-se procedimentos metodológicos internacionalmente aceitos, sistematizando os trabalhos e parte das propostas apresentadas na publicação *"Hydrogeological Maps, A Guide and a Standard Legend"*, de Wilhelm Struckmeier e Joan Margat (1995) e o documento da UNESCO, intitulado *"UNESCO, International Legend for Hydrogeological Maps"*, versão revisada, em 1983.

Os mapeamentos são feitos em escala 1:1.000.000, compatível com a densidade dos produtos e as dimensões continentais envolvidas, as folhas são constituída por cinco bases temáticas principais: planimetria, geologia, poços, pluviometria e hidrologia.

Cada uma dessas bases passou por processos de ajustes e simplificações para se adaptarem à metodologia aplicada e a escala da trabalhos. Na base geológica, por exemplo, algumas unidades inexpressivas do ponto de vista hidrogeológico, como coberturas recentes eventualmente pelíticas e/ou de pequenas espessuras foram excluídas, visando ressaltar aquíferos mais importantes que se encontravam ocultos sob essas unidades. Esta base, oriunda do GIS BRASIL (CPRM, 2003), contém originalmente 2.333 unidades litológicas mapeadas, impossíveis de serem representadas em um mapa que pretende ressaltar aspectos hidrogeológicos, ao invésde fixções meramente estratigráficas ou litológicas. Desta forma, a mesma precisou ser simplificada, pela conversão das unidades geológicas em outros entes que ressaltassem suas características de transmissão e armazenamento de águas subterrâneas, da seguinte forma (Struckmeir & Margat, op.cit):

- Indivídualizando corpos contínuos ou descontínuos, conforme suas características geométricas e formas de ocorrência das águas subterrâneas;
- Classificando-os diferentes tipos litológicos de acordo com as características de fluxo dominantes;

Assim, foram definidas quatro classes taxonômicas, para agrupamento das unidades, classificadas hierarquicamente da mais ampla (a mais abrangente) à menor (a fundamental): *Unidades Hidrolitológicas* (porosas, cársticas, fraturadas e não aquíferas), onde se considera apenas a forma de acúmulo e condução de águas subterrâneas, os *Sistemas Aquíferos* (união de dois ou mais aquíferos para criar um novo domínio), *Aquíferos* (correspondentes a unidades geológicas, reforçando variações espaciais em suas características hidrogeológicas) e *X* **Unidades Hidroestratigráficas**, agrupando formações geológicas em parte delas que armazenam e transmitem águas subterrâneas de forma suficiente para possibilitar a ocorrência de extração econômica, e formações geológicas impermeáveis, que atuam como barreiras a esses fluxos.

Para a hierarquização destas unidades em termos de produtividades hídricas, foi elaborada uma tabela (Diniz et al, 2012) de "Caracterização Hidráulica das Classes dos Aquíferos", baseada no trabalho de Struckmeir e Margat (1995, Op. cit.). Na sua elaboração, os tempos de bombeamento foram estipulados em 12 horas contínuas e os rebaixamentos fixados em 25 metros, para a comparação das produtividades de cada poço analisado.

UNIDADES HIDROESTRATIGRAFICAS

Unidades Granulares

Depósito Aluvionar – Qa

Localização – Ocorrem em uma área de 46.800 km², ocupando as calhas e planícies aluvionares dos rios Amazonas, Tapajós, Trombetas, Uatumã, Paracaita, Nhamundá e Jatapu dentre outros. Estes depósitos podem atingir até 60 km de extensão lateral, e suas espessuras, bastante variáveis, podem atingir aproximadamente 40 metros.
Características Litológicas – Constituem aquíferos livres, descontínuos, de granulometria fina a média, mas, também grosseiros, com contribuição de silte e argila, depositados ao longo dos canais ativos das drenagens e em áreas sujeitas a inundações.
Características Hidrogeológicas – Constituem um aquífero livre descontínuo, com extensão e espessuras limitadas. As vazões variam de 10 a 25 m³/h. As alturas de pequena extensão e espessura, não consideradas nessa escala de trabalho, são utilizadas, através de poços rasos, visando atender pequenas demandas, com vazões entre 1 e 5 m³/h.
Produtividade – De acordo com a classificação adotada, apresenta produtividade *Geralmente Baixa, Porém Localmente Moderada (Classe 4).*
Qualidade – Não existem informações sobre a qualidade físico-química das águas desse aquífero.

Ipixi – NSi

Localização – Abrange a denominada Cobertura Sedimentar de Ipixi, localizada no estado do Amazonas, perfazendo uma área de 5.581 km².
Características Litológicas – É constituído por arenitos finos a médios, siltitos e argilitos, localmente contendo conglomerados e turfas. Na porção basal ocorrem níveis ferríferos e matéria orgânica. Posiciona-se discordantemente sobre a Formação Alter do Chão. Sistemas flúvio-lacustres e fluvial deltaicos, datados do Cenozóico (Terciário-Quaternário), foram responsáveis pela deposição destes sedimentos.
Características Hidrogeológicas – Constitui um aquífero livre, contínuo, de extensão regional. Em geral possui boa porosidade e permeabilidade. Este aquífero pode atingir até 200 metros de espessura.
Produtividade – De acordo com a classificação adotada apresenta produtividade *Moderada (Classe 3).*
Qualidade – Em geral são águas de boa qualidade para consumo humano, com condutividade elétrica que varia de 20 µS/cma 100 µS/cm.

Alter do Chão – K2ac

Localização – Aflora em uma extensa área, distribuída nos estados do Amazonas e Pará, na região correspondente a Bacia Sedimentar do Amazonas, e também, sotoposta às coberturas sedimentares cenozoicas da Formação Içá. Ocupa uma área total de 114.883 km².
Características Litológicas – Composto de arenitos médios a grosseiros, frável, de cores variadas intercalados com argilitos.Por vezes, ocorrem bandas ferruginosas e lentes de arenito silicificado associados. Depositados no Cretáceo, em ambiente fluvial de alta energia e em clima úmido, apresentam espessuras superiores a 1.250 metros.
Características Hidrogeológicas – A unidade Alter do Chão representa o principal aquífero da folha Santarém, ocorrendo como livre, de extensão regional, na Bacia do Amazonas, ou como confinado, quando recoberto pelos sedimentos da Formação Içá. Apresenta vazões entre 100 e 500 m³/h.
Produtividade – Apresenta produtividade *Muito Alta (Classe 1).*
Qualidade – De modo geral, suas águas são boas para consumo humano e apropriadas para a agricultura, apresentando normalmente valores de Sólidos Totais Dissolvidos menores que 100 mg/l. Em alguns casos podem apresentar teores elevados de ferro, o que é natural na região, devido as nascentesarenitosas litológicas.

Monte Alegre – C1ma

Localização – Ocorre afloroado em pequena área (1.618 km²), localizada próxima da borda norte da Bacia do Amazonas e numa estreita faixa localizada no canto sudeste desta Bacia.
Características Litológicas – Constituído predominantemente por arenitos de granulometria média, conglomerados, calcários e siltitos.
Características Hidrogeológicas – Podem constituir aquíferos livres ou confinados. Na folha Santarém ocorre como livre. As vazões captadas neste aquífero se situam entre 10 a 25 m³/h.
Produtividade – Apresenta produtividade *Geralmente Baixa, porém localmente Moderada (Classe 4).*
Qualidade – Não existem informações sobre a qualidade físico-química das águas desse aquífero na área da folha.

Grupo Urupadi – D2u

Localização – Ocupa uma área aflorante de 6.609 km², margeando a borda norte da Bacia Sedimentar do Amazonas.
Características Litológicas – Suas litologias englobam arenitos finos a conglomeráticos, com intercalações de siltitos e folhelhos depositados em ambiente marinho nerítico e flúvio-deltáico.
Características Hidrogeológicas – Comporta-se como aquífero livre, contínuo, de extensão regional. Apresenta vazões entre 25 a 50 m³/h.
Produtividade – Apresenta produtividade *Moderada (Classe 3).*
Qualidade - Não existem informações sobre a qualidade físico-química de suas águas.

Curuá – D3Cu

Localização – Ocupa uma área aflorante de 5.913 km², localizada no extremo norte da folha, margeando o limite norte da Bacia Sedimentar do Amazonas.
Características Litológicas - Predominam, folhelhos negros entapacidos em prita, siltitos e arenitos pertencentes respectivamente às Formações Barreirinhas, Curiri, Oriximiná e Faro.
Características Hidrogeológicas – Constitui aquífero livre, possuindo espessura média de 200 m e vazões em geral menores que 1 m³/h.
Produtividade – Unidade classificada como *Pouco Produtiva ou Não Aquífera (Classe 6).*
Qualidade - Não existem informações sobre a qualidade físico-química de suas águas. Contudo, os aquíferos situados na Formação Barreirinhas devem apresentar águas salinizadas.

Trombetas – O3D1t

Localização – Ocupa uma área aflorante de 8.778 km², localizada no extremo norte da folha, margeando o limite norte da Bacia Sedimentar do Amazonas.
Características Litológicas – Constituída essencialmente de arenitos finos a médios, além de diamictitos, folhelhos e siltitos.
Características Hidrogeológicas – Comporta-se como aquífero livre a confinado, de extensão regional, com espessuras que podem atingir até 1.000 metros.
Produtividade - Classificada como *Geralmente Baixa, porém localmente Moderada (Classe 4).*
Qualidade - Não existem informações sobre a qualidade físico-química de suas águas.

Prosperança – O3pr

Localização – Ocupa uma pequena área aflorante de 283 km², localizada no extremo norte da folha.
Características Litológicas – Constituída essencialmente de arenitos finos a médios, além de diamictites, folhelhos e siltitos.
Características Hidrogeológicas – Comporta-se como aquífero livre a confinado, de extensão regional, com espessuras que podem atingir até 1.000 metros.
Produtividade – Apesar de não existirem dados de poços tubulares captando esta unidade na área, a produtividade esperada para a mesma é de *Geralmente Baixa, porém localmente Moderada (Classe 4).*
Qualidade - Não existem informações sobre a qualidade físico-química de suas águas.

Unidades Cársticas

Itaituba – C2i

Localização – Ocupa pequena área (696 km²), estreita e alongada, localizada próxima à borda sul da Bacia Sedimentar do Amazonas.
Características Litológicas – Constitui uma sequência cíclica composta de vários litotipos como calcários bioclásticos marinhos, dolomitos, folhelhos, siltitos, arenitos e evaporitos.
Características Hidrogeológicas – Representam aquíferos cársticos regionais com vazões situadas entre 10 e 25 m³/h.
Produtividade - Classificada como *Geralmente Baixa, porém localmente Moderada (Classe 4).*
Qualidade - Não existem informações sobre a qualidade físico-química de suas águas, porém, em geral, devem atender aos padrões de potabilidade.

Unidades Fraturadas

Embasamento Fraturado Indiferenciado – Fr

Localização – Aflora em uma área total de 93.803 km².
Características Litológicas – Engloba uma vão de tipos litológicos como granitoides, valcânicas, metavulcanicas, metassedimentos, gnaisses, migmatitos, granulitos, xistos e quartzitos.
Características Hidrogeológicas – Configura um meio descontínuo, caracterizado pela ocorrência de reservatórios aleatórios que no conjunto formam uma unidade hidrogeológica. Apresenta baixas vazões, geralmente menores que 1 m³/h, ou entre 1 a 10 m³/h.
Produtividade - Apresenta produtividades enquadradas como *Rara, porém localmente Muito Baixa (Classe 5) ou Pouco Produtiva ou não Aquífera (Classe 6).*
Qualidade - Não existem informações sobre a qualidade físico-química de suas águas.


60°W
59°W
58°W
57°W
56°W
55°W
54°W
1°N
2°S
3°S
4°S
(5) Fr
(6) Fr
(4)KOpr
(4) O3D1t
(3) D2u
(4) C2no
(6) D3C1c
(4) C2ma
(4) K2ac
(4) C2ho
(3) D3C1c
(1) K2ac
(4) Qa
(3) D2u
(4) C2ho
(3) D3C1c
(4) C2ho
(4) C2ho
(4) C2ho