


Mostra a variação das concentrações relativas dos três radioelementos relacionando-os com as cores vermelho (K-red), verde (G-green) (Th) e azul (B-blue) (eU). O espectro de cores varia do branco, quando coincidente as máximas concentrações relativas nos três radioelementos, até o preto, para os mínimos valores relativos.



No mapa de gradiente total a anomalia magnetométrica é centralizada em relação ao corpo causativo, o caráter dipolar é suprimido, o que simplifica a interpretação. Todavia, dimensões horizontais na anomalia em relação ao corpo causativo são extrapoladas. Recomendamos a utilização deste produto para realçar a distribuição de rochas/minerais magnéticos na área, e também como forma de simplificar a interpretação dos usuários. A deconvolução Euler utiliza derivadas do campo magnético anômalo para estudar a geometria das fontes magnetométricas localizadas em subsuperfície. Neste trabalho foi empregado o índice 1 para a deconvolução de Euler com o intuito de realçar as estruturas lineares magnéticas da área.









Imagem Google Earth - Novembro 2020.




PERÍODO	Descrição	Província Rondônia-Juruena	FOLHA DE ESTUDO
NEOZOICO	Coberturas sedimentares recentes	Plútonismo alcali-cálcico a cálcio-albino de alto potássio: Supergrupo Juruena (1813-1772 Ma)	Plútonismo alcali-cálcico a cálcio-albino de alto potássio: Supergrupo Juruena (1813-1772 Ma)
MESOZOICO	Magma máfico intracrustal	Bacia cretácica plioformal com magnetismo máfico e basaltos: Formação Dacianópolis e Anápolis	Domínio granítico-magnetítico de alto grau (Complexo Serra Monte Verde - 1500-1700 Ma)
PALEOZOICO	Bacia intracrustal tipo ISIF: Separação silicática e granita: Bacias do Cachorro e Piarco	Associação magnética do tipo AMCC: Sula Intrusiva	OROGRAFIA
NEOPROTEROZOICO	Magma intrusiva Tipo A: Sula Intrusiva (200 Ma)	Associação magnética do tipo AMCC: Sula Intrusiva (1570-1532 Ma)	Província Tapira-Prima - Domínio Pelotas de Azevedo
PROTEROZOICO	Sucessão silicática de ambiente intraplaca. Formação Palmira (1000 Ma)	Associação magnética do tipo AMCC: Sula Intrusiva (1570-1532 Ma)	Granitos pós-orogênicos (1800-1600 Ma)
		Associação magnética do tipo AMCC: Sula Intrusiva (1570-1532 Ma)	Arco Magnético Cuiabá (2000-1600 Ma)
		Associação magnética do tipo AMCC: Sula Intrusiva (1570-1532 Ma)	Orógenos magnéticos e magnetogrênites - Complexo Cuiabá (2000-1600 Ma)



Depósitos Aluvionares (58)	PROVÍNCIA RONDÔNIA-JURUENA	Suite Mítica Vespou (24)
Básicas Indiferenciadas (53) <td>SUITE SERRA DA PROVIDÊNCIA<td>Suite São Pedro (23)</td></td>	SUITE SERRA DA PROVIDÊNCIA <td>Suite São Pedro (23)</td>	Suite São Pedro (23)
Suite Rondônia (42) <td>Indivíduo (31)<td>Suite Vitória (22)</td></td>	Indivíduo (31) <td>Suite Vitória (22)</td>	Suite Vitória (22)
GRUPO DOS IRMÃOS	GRUPO ROOSEVELT	
Formação Palmira (41)	Indivíduo (27)	



CRÉDITOS DE AUTORIA	DIRETOR PRESIDENTE DO SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL - CPRM	COORDENAÇÃO TÉCNICA NACIONAL
Luiz Gustavo Rodrigues Pinto, Iago Sousa Lima Costa, Márcia Vinícius Ferraz, Francisco Sena Rios, Cibele Ladeira Alves, Felipe Matheus Tavares, Denilson de Azevedo, Francisca da Paula da Silva Lima Abreu, Viviane Carmo Ferrati, Dalaine Barbara Boehardt, Diogo Alves de Sordi, Gilmar José Rizzotto	Estevão Pedro Chagas	DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA Lúcia Travassos da Rosa Costa
	DIRETOR DE GEOLOGIA E RECURSOS MINERAIS Márcio José Remédio	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MINERAIS Marcelo Estêvão Almeida
		DIVISÃO DE GEOLOGIA BÁSICA Vladimir Cruz de Medeiros
		DIVISÃO DE GEOLOGIA ECONÔMICA Eduardo Matheus Tavares
		DIVISÃO DE SEMBRAMENTO REMÍO E GEOFÍSICA Luiz Gustavo Rodrigues Pinto
		DIVISÃO DE GEOQUÍMICA Silvana de Carvalho Melo



NOTA TÉCNICA
Com o objetivo subsidiar de informações geocientíficas as iniciativas e projetos de pesquisa mineral do setor privado, o Serviço Geológico do Brasil-CPRM disponibiliza diversos produtos que visam auxiliar na definição de áreas potenciais para prospeção. Este novo produto denominado "carta de anomalias" é apresentado para diversas áreas do território brasileiro, que incluem províncias minerais consolidadas ou em consolidação. A "carta de anomalias" é suportada por um banco de dados de imagens geofísicas, geológicas, geoquímicas e de recursos minerais, disponibilizado no site do Serviço Geológico do Brasil - CPRM.

O banco de dados aerogeofísico utilizado na construção deste produto foi obtido através do Projeto Aerogeofísico Nordeste do Mato Grosso, adquirido no ano de 2009 pelo Serviço Geológico do Brasil - CPRM. Esse projeto possui espaçamento entre as linhas de voo de 500 m na direção norte-sul e altura média de voo de 100 m. Linhas de controle espaçadas de 10 km na direção leste-oeste complementam os dados. Devido às características dos equipamentos utilizados na aquisição dos dados, tem-se em média, ao longo da linha de voo uma leitura magnetométrica a cada 8 m e uma leitura gamaespectrométrica a cada 80 m.

Esta carta é um produto gerado a partir de processamentos que resultam emriquecimentos nos tores de potássio e urânio em associação com o aumento da susceptibilidade magnética em subsuperfície. Estes processamentos compreendem: filtro antirruído (US: COSYR et al. 2020), o produto entre o potássio e o gradiente total (K*G^T), e o produto entre o urânio e o gradiente total (U*G^T). O U*G^T e desenvolvido por aprendizado de máquina, onde o possível sódio o enriquecimento de urânio relacionado a processos sedimentares, tais como o intemperismo ou alteração hidrotermal. Os produtos entre o gradiente total e o potássio/urânio resultam o aumento da susceptibilidade magnética associada a elevados valores destes radioelementos. Esta carta pode ser formulada matematicamente como: U*G^T*K*U*G^T, onde altos valores (em vermelho) representam a alta associação entre os produtos. Todos os produtos foram previamente normalizados entre 0 e 1 para evitar diferença de peso entre os processamentos. Cabe ressaltar que este mapa não representa um mapa de propriedade mineral e sim um produto adicional aos mapas padrão contemplados no banco de dados geofísicos, com o intuito de favorecer um sistema mineral específico. Com a disponibilização dos outros diversos temas aerogeofísicos, caberá ao usuário escolher qual a associação entre produtos que melhor representa o modelo metalogênico compreendido pelo mesmo.

CITACÕES BIBLIOGRÁFICAS
COSTA, I. S. L., SERAFIM, I. C. C. D. O., TAVAR E. S. F. M., POL. D. H. J. D. O., 2020. Uranium anomalies detection through Random Forest regression. Exploration Geophysics. <https://doi.org/10.1080/08123985.2020.1725387>.

ALVES, C. L., RIZZOTTO, G. J., RIOS, F. S., GONCALVES, G. F. Goiânia: CPRM, 2019. 228 p. : il. 1 mapa. (Informe de recursos minerais. Série Províncias Minerais do Brasil - 22).

JESSEL, M. W., VALENTA, R. K., 1996. Structural geophysics: integrated structural and geophysical modelling. Computer Methods in the Geosciences, 15, 303-324. [https://doi.org/10.1016/S1574-5614\(96\)00027-7](https://doi.org/10.1016/S1574-5614(96)00027-7).

As amostras de concentrados de minerais pesados foram coletadas de maneira simples a partir de 15 l de material aluvionar, e acondicionadas em sacos plásticos. As amostras foram submetidas à análise mineralógica ótica semiquantitativa e contagem de pontas de ouro nos Laboratórios de Análises Minerais do SGB-CPRM nas Superintendências Regionais de Porto Alegre e Recife. Os pontos de destaque mineralométricos foram selecionados por conterem partículas de ouro elevadas.

Os pontos de amostragem geoquímica mostram concentrações destacadas para os elementos Au, Cu, Pb e Zn, onde foram considerados valores de concentração maiores que 75% da população de cada elemento.

Os lineamentos foram extraídos a partir da análise estrutural simplificada da aeromagnetometria (primeira derivada vertical do campo magnético anômalo) e de imagens de radar (vetor transformado a partir do SRTM - Shuttle Radar Topography Mission (NASA), conforme metodologia padrão de geofísica estrutural (p. ex. JESSEL-VALENTA, 1996).

Primeiramente, foram extraídas descontinuidades da trama de susceptibilidade magnética, classificadas com o método (descontinuidades curvilineas a lineares, tangenciais em relação à trama), ruído-dúcteis (descontinuidades majoritariamente lineares, oblíquas à trama e com evidências de arraste de feições preferiais) ou rúpteis (descontinuidades lineares, sem arraste significativo). Os traços foram então correlacionados com quebras de relevo, visíveis na imagem de radar, no entanto parte destes não possui expressão superficial (especialmente lineamentos dúcteis), podendo tratar-se de estruturas subterráneas.

AVISO LEGAL
O conteúdo disponibilizado nesta carta ("Conteúdo") foi elaborado pelo Serviço Geológico do Brasil - CPRM, com base em dados obtidos através de trabalhos próprios e de informações de domínio público. A CPRM não garante: (i) que o Conteúdo atenda ou se adequa às necessidades de todos os usuários; (ii) que o Conteúdo e o acesso a ele estejam totalmente livres de falhas; (iii) a total precisão de quaisquer dados ou informações contidas no Conteúdo, apesar das precauções de controle tomadas pela CPRM. Assim, a CPRM, seus representantes, diretores, prepostos, empregados e acionistas não podem ser responsabilizados por eventuais incorreções ou omissões contidas no Conteúdo. Da mesma forma, a CPRM, seus representantes, diretores, prepostos, empregados e acionistas não respondem pelo uso do Conteúdo, e sugere que os usuários utilizem sua própria experiência no tratamento das informações contidas no Conteúdo, ou busquem aconselhamento de profissionais independentes capazes de avaliar as informações contidas no Conteúdo. O Conteúdo não constitui aconselhamento de investimento, financeiro, fiscal ou jurídico, tampouco prevê recomendações relativas a instrumentos de análise geocientífica, de investimentos ou eventuais produtos. Por fim qualquer trabalho, estudo ou análise que utilize o Conteúdo deve fazer a devida referência bibliográfica.